



효과적인 **땀** 컨트롤, **데오클렌[®]액** (염화알루미늄)

데오클렌[®]액 올바른 사용법

1. 워싱 전 저녁, 해당 부위를 깨끗이 씻어냅니다.
2. 드라이기나 선풍기를 이용하여 잘 말려줍니다.
3. 데오클렌액을 꼼꼼히 발라줍니다.
4. 다음날 물로 깨끗이 씻어 주세요.

데오클렌[®]액 용기 사용법

- 1Step 액이 쏟아지지 않도록 수평인 상태에서 캡을 개봉합니다.
- 2Step 롤온타입의 불을 용기와 액이 흘러나오지 않도록 결합한 후 사용합니다.
- 3Step 사용 후에는 높은 캡으로 담아 보관합니다. (보관시 세워서 보관하세요.)

【원료약품 및 그 분량】 100 ml 중

■ 유효성분 : 염화알루미늄(USP).....20.00 g(무수물로서는 11.00 g)

■ 기타 첨가제 : 정제수, 폴리에틸렌글리콜 400, 트롤아민, 히프로멜로오스

【성상】 특이한 냄새가 있는 무색 또는 연한 노란색의 투명한 액

【효능·효과】 손, 겨드랑이, 발의 다한증(땀 과다증)

【용법·용량】 저녁에 적용 부위에 적당량을 바른 후 다음날 아침 물로 씻어 제거한다. 발한(땀이 남)이 멈출 때까지는 매일 밤 한번씩 사용하고 증상이 호전(나아짐) 될 경우에는 일주일에 1~2회로 줄인다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것 : 이 약 성분에 과민증인 환자.
2. 다음 부위에는 적용하지 말 것 : 이 약을 벗겨지거나 손상된 피부, 또는 최근에 면도한 부위에는 적용하지 말 것.
3. 일반적 주의
 - 1) 치료 대상 부위에만 사용하여야 하며 적용 부위는 완전히 건조한 상태를 유지시켜야 한다.
 - 2) 눈이나 점막에 닿지 않도록 주의한다.
 - 3) 이 약을 사용 후 땀뿌의 감소가 일시적으로 자극감이나 발적(충혈되어 붉어짐)을 초래할 수 있으며 이러한 증상이 심해지면 사용을 일시 중단하여야 한다.
 4. **과다 적용시의 처치** : 과다 적용시 자극감, 발적(충혈되어 붉어짐), 낙설이 일어날 수 있으며 이러한 증상이 나타났을 경우 필요에 따라 습윤제나 1% 히드로코르티손 크림을 바른다.
 5. **적용상의 처치** : 이 약을 적용하기 바로 직전에 목욕은 피해야 하며 적어도 적용 후 한 시간은 지나야 한다. 겨드랑이의 털은 이 약을 적용하기 12시간 전후로는 제거하지 말아야 한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 25 °C이하 서늘한 곳 보관

【포장단위】 30 ml

【교환 및 제품문의】

- ※ 사용전에 설명서를 반드시 주의 깊게 읽고, 설명서를 제품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리고, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 의약품용 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://hedrug.mfds.go.kr>)의약품 등 검색을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 소비자상담실(수신자부담):080-861-8282로 문의하시기 바랍니다.

【제조판매업】