

Sweatrol®

스웨트롤® 패드액

■ 다한증(Hyperhidrosis)이란?

아직 정확한 원인은 알 수 없지만 자율 신경계의 이상으로 특정부위에 과도하게 땀이 나는 질환으로, 일반적인 특정부위에서 5분간 100mg 이상 배출되면 다한증(땀 과다증)으로 정의됩니다.

■ 스웨트롤패드액의 약리작용

항콜린제 약물(anticholinergic drug) 중 하나로 부교감 절후 섬유질의 콜린성 신경 및 그 외 아세틸콜린에 반응하는 수 용체 기관에 대한 아세틸콜린 작용을 길항적으로 차단하는 부교감 신경 억제제입니다.

〈스웨트롤패드액의 효과적인 사용방법〉

- 1단계 : 해당부위 안면을 깨끗이 씻고 완전히 건조시킨다.
(스웨트롤패드액의 효과적인 적용을 위해 세안 후 완전히 건조하여 안면을 보송보송하게 합니다.)
- 2단계 : 스웨트롤패드액을 얼굴에 적용하기 전에 우측에 그림을 확인하시고 눈, 코, 입 주변을 제외한 범위 내에서 적용합니다.
(적용가능한 얼굴부위 우측 그림 참조)
- 3단계 : 1)스웨트롤패드액 1매용 포장지를 개봉하여 약액이 묻어있는 부직포 패드를 꺼낸다.
2)약액이 묻어있는 부직포 패드를 해당부위(2단계 참고) 얼굴에 (눈, 코, 입 제외) 골고루 문도록 5회 정도 가볍게 문지른다.
(스웨트롤패드액이 묻은 손은 비누 및 세정제를 통해 깨끗히 씻는다.)
- 4단계 : 1)스웨트롤패드액 적용이후 적어도 4시간 동안은 적용부위를 씻지 않는다.
2)적용후 1~2시간 전에 과도한 운동으로 땀이 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
(손으로 눈을 만지거나 비비는 행동은 주의한다.)



【원료약품 및 그 분량】 이 약 1매 (지름 : 54.0 mm, 약액 1.17 ml) 중

■ 유효성분 : 글리코피롤레이트(USP)..... 23.4 mg

■ 기타첨가제 : 부직포패드, 염산, 에탄올, 정제수

【성상】 에탄올 냄새가 나는 무색투명한 액이 흡착되어 있는 원형부직포패드

【효능효과】 안면 다한증(땀과다증)

【용법용량】 성인 1일 1회, 이 약 1매를 눈, 코, 입을 제외한 안면 환부(질환부위)에 가볍게 5회 정도 문지른다.

이 약은 적용하기 전에 환부를 깨끗이 씻고 충분히 건조시켜야 하며, 적용 후 4시간 이내에는 환부를 씻지 않아야 한다.



【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 이 약 또는 항콜린제에 과민반응 및 병력이 있는 환자
 - 2) 눈내장 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치료과사, 약사와 상의할 것
 - 1) 폐쇄성 요로질환(예 : 전립선비대로 인한 방광경부폐쇄증) 환자
 - 2) 폐쇄성 위장관질환 환자
 - 3) 마비성 장폐색증 환자
 - 4) 장관이완증 환자(고령자나 허약한 환자의)
 - 5) 심장혈관부전증 환자
 - 6) 중증 궤양성 대장염 및 이에 합병된 거대결장 환자
 - 7) 중증 근무력증 환자
 - 8) 임부: 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 9) 수유부: 이 약이 모유로 분비되지 않더라도 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치료과사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 눈 : 동공확대, 시야흐림
 - 2) 신경계 : 어지러움, 두통
 - 3) 피부 : 발진, 자극감
 - 4) 기타 : 입마름증
4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 1) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상치료)이다
 - 2) 과도한 땀의 분비가 최근에 발생한 경우에는, 이 약을 사용하기 전에 땀의 분비가 다른 질병(예, 갑상선 기능항진증, 결핵 등)으로 인한 것이 아닌가를 확인해야 한다.
 - 3) 치료 대상 부위에만 사용하여야 한다.
5. 적용상의 주의사항
 - 1) 눈, 코 또는 입 점막에는 사용하지 않으며, 약액이 묻지 않도록 주의한다.
 - 2) 이 약은 벗겨지거나 손상된 피부 또는 최근에 면도한 부위에는 적용하지 않는다.
 - 3) 콘택트 렌즈를 착용해야 하는 경우에는 렌즈를 먼저 적용하고 난 후에 이 약을 사용하거나, 이 약을 사용하고 난 후 손을 깨끗이 씻고 렌즈를 착용한다.
 - 4) 적용 후 4시간 이내에는 씻지 않아야 한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 보관한다.

【포장단위】 1매입, 5매입

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변태 또는 오소된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래 위원회고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

* 소비자상담실(수신자부담) : 080-861-8282

